FILOSCHOOL

Bem-vindo(a) à nossa aplicação de preparação para exames! Chegou a hora de se destacar nos seus testes e conquistar o sucesso académico que você merece.

Apresentamos o "Guião de Exames Resolvidos": a sua ferramenta definitiva para uma preparação eficaz e resultados brilhantes!

Aqui, encontrará uma vasta colecção de exames anteriores cuidadosamente seleccionados e resolvidos por especialistas em cada área. Nossa aplicação é perfeita para estudantes de todos os níveis académicos, desde o ensino médio até a graduação universitária.

GUIA DE RESOLUÇÃO DO EXAME DE ADMISSÃO À UEM, QUÍMICA, 2018

1. Alternativa **B**.

Primeiro temos de saber o que são **Propriedades Químicas**. As propriedades químicas são aquelas relacionadas a transformação de substâncias em outras (ou seja, fenómeno químico ou reacção química). Como exemplos, podemos citar a combustão, as reacções redox, etc.

2. Alternativa **B**.

Veja a explicação para o número anterior. A deposição da fuligem é um processo físico.

3. SEM ALTERNATIVA CORRECTA.

Primeiro há que saber o que são misturas homogéneas e heterogéneas:

- **Mistura homogénea** – é aquela que não é possível distinguir os seus componentes. É monofásica.
- **Mistura heterogénea** – é aquela que é possível distinguir os seus componentes. É polifásica.

Água lamacenta é uma suspensão, ou seja, uma mistura heterogénea na qual algumas partículas se depositam com o tempo.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

Betão é também uma mistura heterogénea;

Refresco é uma mistura heterogénea constituída por uma fase líquida e outra gasosa.

Ar liquefeito é uma mistura **homogénea**. Toda a mistura de gases é sempre uma **mistura homogénea**.

4. Alternativa **E**.

- **Substâncias imiscíveis** – são aquelas que não se misturam (nã formam uma mistura homogénea);

Agora é importante saber que quanto maior for a densidade de uma substância ela tenderá a afundar, ou seja, ficar no fundo. Assim, aquela substância que tiver maior densidade ficará no fundo, deste modo ficamos com a seguinte sequência: (DE CIMA PARA BAIXO).

Ciclohexano < Água < Mercúrio

$0,778 < 1,00 < 13,6$

5. Alternativa **D**.

Dados: $d = 1,50 \text{ g/cm}^3$ | $m = 150 \text{ mg} = 0,15 \text{ g}$ | Pedido: $V - ?$

Tendo em conta a fórmula de densidade:

$$d = \frac{m}{V}$$

Isolando o volume e substituindo pelos dados fornecidos:

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{d} \Rightarrow V = \frac{0,15 \text{ g}}{1,50 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} \Rightarrow V = 0,1 \text{ cm}^3$$

6. Alternativa **A**.

Dados: dose: $20 \mu\text{g/kg}$ | Peso: 60 kg | Pedido: Quantidade ?

1.º passo: Calculemos a quantidade pela dosagem e peso: $Q_t = 20 * 60 = 1200 \mu\text{g}$.

2.º passo: Converter de micrograma para miligrama, dividindo por 1000: $1200/1000 = 1,2 \text{ mg}$.

7. Alternativa **C**.

Dados: $1 \text{ carate} = 200 \text{ mg}$ | $m: 44,4 \text{ carates}$ | Pedido: Quantidade ?

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

13. Alternativa **E**.

14. Alternativa **C**.

Recordando:

- Ligação covalente apolar: ocorre entre átomos de mesmo elemento químico, sendo ametal.
- Ligação covalente polar: ocorre entre átomos de elementos químicos diferentes e ametálicos.
- Ligação iônica: ocorre entre um metal e ametal.
- Ligação metálica: ocorre entre átomos de elementos metálicos.

15. Alternativa **D**.

16. Alternativa **C**.

Distribuindo electronicamente por subníveis de energia:

O elemento X tem 2 electrões e o Y tem 7 electrões na última camada ou a camada de valência. Nesse sentido, sabe-se que o elemento X formará catião, pois doaram os seus 2 electrões, enquanto o elemento Y aceitará 1 electrão, de modo que consiga atingir a estabilidade electrónica.

Assim, os seus iões serão: X^{2+} e Y^- . O elemento mais electronegativo fica à direita. Trocando os seus expoentes (regra da tesoura): **XY_2** .

17. Alternativa **C**.

De acordo com Moseley, as propriedades físicas e químicas dos elementos químicos na tabela periódica variam com a variação do número atómico.

Dentre as propriedades periódicas, existe a electropositividade, também conhecida por carácter metálico, que indica a tendência dos átomos de perderem (ou cederem) electrões numa ligação química. O carácter metálico aumenta da direita para a esquerda (nos períodos ou horizontal) e de cima para baixo (nos grupos ou vertical).

O frâncio é o elemento mais electropositivo ou com maior carácter metálico. Os gases nobres, como não se ligam, têm electropositividade descartável.

Façamos a distribuição electrónica por subníveis energéticos:

Com isso, sabemos que: A, B e D pertencem ao mesmo grupo (IA); B e C pertencem ao mesmo período

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/879369395)

(3.º período).

Dissemos que o carácter metálico aumenta: no mesmo grupo – de cima para baixo, ou seja, do menor número atómico ao maior; portanto: A – B – D. No mesmo período – da direita a esquerda, isto é, do maior número atómico para o menor; por isso: C – B. Note que: QUALQUER ELEMENTO METÁLICO TEM MAIOR ELECTROPOSITIVIDADE QUE QUALQUER ELEMENTO AMETÁLICO.

Conclusão: C – A – B – D.

18. Alternativa **E**.

A equação da reacção acertada entre o perclorato de potássio e a sacarose é:

19. Alternativa **D**.

O oxigénio é uma molécula diatómica, ou seja, tem 2 átomos. Portanto:

$$1 \text{ mol de O}_2 \text{ ----- } 2 \times 6 \times 10^{23} \text{ átomos}$$

$$X \text{ ----- } 3 \times 10^{24} \text{ átomos}$$

$$x = \frac{3 * 10^{24} \times 1 \text{ mol}}{2 \times 6 * 10^{23}} \Rightarrow x = 0,25 * 10^{24-23} \text{ moles} \Rightarrow x = 0,25 \times 10 \text{ moles} = 2,5 \text{ moles}$$

20. Alternativa **E**.

Considerando a equação da reacção acertada:

Pode-se afirmar que as substâncias reagem nas seguintes proporções: 2:1:2.

2 moles de mercúrio reagem com 1 mol de oxigénio; em termos de massa:

2*200 g de mercúrio reagem com 2*16 g de oxigénio

100 g de mercúrio reagem com y

$$x = \frac{100 \text{ g} \times 32 \text{ g}}{400 \text{ g}} \Rightarrow x = 8 \text{ g de oxigénio}$$

21. Alternativa **D**.

1.º passo: calcular a massa molecular de C₃H₄.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://www.whatsapp.com/business/profile/879369395)

$$MM(C_3H_4) = 3 \cdot Ar(C) + 4 \cdot Ar(H)$$

$$MM(C_3H_4) = 3 \cdot 12 + 4 \cdot 1$$

$$MM(C_3H_4) = 40 \text{ u.m.a}$$

2.º passo: determinar a razão entre a fórmula empírica e molecular.

Sabe-se que a obtenção da fórmula empírica é mediante a divisão dos índices dos elementos que compõem a fórmula molecular por um mínimo múltiplo comum. Assim sendo, teremos:

$$Razão = \frac{120,19 \text{ u. m. a}}{40 \text{ u. m. a}} \approx 3$$

Visto que a razão é 3. A fórmula molecular será: $C_{3 \times 3}H_{4 \times 3} = C_9H_{12}$.

22. Alternativa **C**.

$$MM(CaMg_3Si_4O_{12}) = Ar(Ca) + 3 \cdot Ar(Mg) + 4 \cdot Ar(Si) + 12 \cdot Ar(O)$$

$$MM(CaMg_3Si_4O_{12}) = 40 + 3 \cdot 24 + 4 \cdot 28 + 12 \cdot 16$$

$$MM(CaMg_3Si_4O_{12}) = 416 \text{ u.m.a}$$

$$MM(C_6H_8O_6) = 6 \cdot Ar(C) + 8 \cdot Ar(H) + 6 \cdot Ar(O)$$

$$MM(C_6H_8O_6) = 6 \cdot 12 + 8 \cdot 1 + 6 \cdot 16$$

$$MM(C_6H_8O_6) = 176 \text{ u.m.a}$$

$$MM(Fe_4[Fe(CN)_6]_3) = 7 \cdot Ar(Fe) + 12 \cdot Ar(C) + 12 \cdot Ar(N)$$

$$MM(Fe_4[Fe(CN)_6]_3) = 7 \cdot 56 + 18 \cdot 12 + 18 \cdot 14$$

$$MM(Fe_4[Fe(CN)_6]_3) = 860 \text{ u.m.a}$$

23. Alternativa **C**.

i. Fórmula molecular: **MgSO₄·7H₂O**.

ii. Mass molar:

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

$$MM(\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = Ar(\text{Mg}) + Ar(\text{S}) + 11 \times Ar(\text{O}) + 14 \times Ar(\text{H})$$

$$MM(\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 24 + 32 + 11 \times 16 + 14 \times 1$$

$$MM(\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 246 \text{ g/mol}$$

iii. Número de moles em 1,23 g

1 mol de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ contém 246 g

X contém 1,23 g

$$x = \frac{1 \times 1,23}{246} \Rightarrow x = \mathbf{0,005 \text{ moles}}$$

iv. Massa de água na amostra

1 mol de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ contém 7 moles de H_2O

Em termos de massa:

246 g de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ contém 7×18 g de H_2O

1,23 g de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ contém y

$$y = \frac{1,23 \times 7 \times 18}{246} \Rightarrow y = \mathbf{0,63 \text{ g}}$$

v. Número de átomos de oxigênio

Pela lei de Avogadro: $n = \frac{N}{N_A}$ e, sabe-se que: $n = \frac{m}{M}$, igualando as duas fórmulas:

$$n = n \Rightarrow \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} \Rightarrow N = \frac{m \times N_A}{M}$$

Na fórmula molecular do composto, existem 11 átomos de oxigênio. Portanto:

$$N = \frac{m \times N_A}{M} \Rightarrow N = \frac{1,23 \text{ g} \times 6,023 \times 10^{23} \times 11 \text{ átomos}}{246 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}$$

$$\Rightarrow N = 0,33 \times 10^{23} \text{ átomos} = \mathbf{3,3 \times 10^{22} \text{ átomos}}$$

24. Alternativa **C**.

1.º passo: calculemos a massa molar de ambas substâncias.

Para a hidroxiapatite:

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

$$MM(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}) = 5 \times \text{Ar}(\text{Ca}) + 3 \times \text{Ar}(\text{P}) + 13 \times \text{Ar}(\text{O}) + \text{Ar}(\text{H})$$

$$MM(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}) = 5 \times 40 + 3 \times 31 + 13 \times 16 + 1$$

$$MM(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}) = 502 \text{ u.m.a}$$

Para a fluoroapatite:

$$MM(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}) = 5 \times \text{Ar}(\text{Ca}) + 3 \times \text{Ar}(\text{P}) + 12 \times \text{Ar}(\text{O}) + \text{Ar}(\text{F})$$

$$MM(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}) = 5 \times 40 + 3 \times 31 + 12 \times 16 + 19$$

$$MM(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}) = 504 \text{ u.m.a}$$

2.º passo: determinar a variação percentual.

$$502 \text{ u.m.a} \text{ ----- } 100\%$$

$$504 \text{ u.m.a} \text{ ----- } c$$

$$c = \frac{504 \times 100\%}{502} \Rightarrow x = \mathbf{100,4\%}$$

A conversão da hidroxiapatite em fluoroapatite acarreta aumento da massa do esmalte em 0,4 % (100,4% - 100%).

25. Alternativa

1.º passo: calcular a massa molar de tetraciclina.

$$MM(\text{C}_{22}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_8) = 22 \times \text{Ar}(\text{C}) + 24 \times \text{Ar}(\text{H}) + 2 \times \text{Ar}(\text{N}) + 8 \times \text{Ar}(\text{O})$$

$$MM(\text{C}_{22}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_8) = 22 \times 12 + 24 \times 1 + 2 \times 14 + 8 \times 16$$

$$MM(\text{C}_{22}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_8) = 444 \text{ g/mol}$$

2.º passo: determinar a quantidade diária de tetraciclina.

$$\text{Quantidade: } 0,24 \times 8 = 1,92 \text{ } \mu\text{mol}$$

3.º passo: converter μmol em mol. De seguida, determinar o equivalente em massa.

1 μmol corresponde a 10^{-6} moles. Portanto: $1,92 \times 10^{-6}$ moles.

Por sua vez:

1 mol de tetraciclina contém 444 g

$1,92 \times 10^{-6}$ moles de tetraciclina contém x

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

$$x = 1,92 \times 10^{-6} \times 444 \Rightarrow x = 8,5 \times 10^{-4} \text{ g}$$

4.º passo: dividir pelo número de tomas ao dia.

$$\frac{8,5 \times 10^{-4} \text{ g}}{4} \approx 2 \times 10^{-4} \text{ g} = 2 \times 10^{-4} \times 10^3 \text{ mg} = 2 \times 10^{-1} \text{ mg} = \mathbf{0,2 \text{ mg}}$$

26. Alternativa **D**.

Partindo do pressuposto que “*semelhante dissolve semelhante*” e que a água é polar e o tetracloreto de carbono é apolar, então:

- C_8H_{18} é apolar, então dissolve-se em tetracloreto de carbono.
- I_2 é apolar, então dissolve-se em tetracloreto de carbono.
- Na_2SO_4 é polar, então dissolve-se em água.
- HCl é polar, então dissolve-se em água.
- C_6H_6 é apolar, então dissolve-se em tetracloreto de carbono.

27. Alternativa **A**.

Molaridade

Sabe-se que concentração molar é dada pela fórmula: $C = \frac{n}{V}$. Também que a massa molar é igual a $M = \frac{m}{n}$. Isolando o “n” (n.º de moles ou quantidade de matéria) na segunda fórmula: $n = m/M$, e substituindo na primeira fórmula, teremos:

$$C = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{m}{M \cdot V}$$

Substituindo pelos dados fornecidos:

$$C = \frac{9 \text{ g}}{180 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,25 \text{ L}} \Rightarrow C = \mathbf{0,2 \text{ mol/L}}$$

Molalidade

$$m = \frac{n}{m_{\text{solvente}}} = \frac{0,05 \text{ mol}}{0,25 \text{ kg}} = \mathbf{0,2 \text{ mol/kg}}$$

28. Alternativa

Recorrendo à fórmula de molaridade:

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

A reacção global é o somatório das etapas da reacção:

37. Alternativa **C**.

O segredo está no facto da velocidade ser proporcional à concentração molar de A.

38. Alternativa **A**.

A variação de pressão afecta as equações de reacção que têm intervenientes nos estados gasoso e líquido.

39. Alternativa **C**.

	$A_{(g)}$	+	$2B_{(g)}$	$\leftrightarrow$	$AB_{2(g)}$
INÍCIO:	2		4		0
VARIAÇÃO:	-x		-3		+x
EQUÍLIBRIO:	2-x		1		x

No início da reacção, misturam-se 2 moles de A e 4 moles de B. Sabendo que 75% de B reagiram, tem-se:

4 mol de B ----- 100%

X ----- 75%

X = 3 mol de B reagiu.

No equilíbrio ficar-se-á com: $4-3 = 1$ mol

Determinemos a quantidade de A que reagiu ao reagirem 75% de B:

2 moles de A ----- 4 moles de B

X ----- 3 mol de Y

X = 1,5 mol

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/879369395)

No equilíbrio teremos: $2 - 1,5 = 0,5$ mol

Como a quantidade de A consumida é igual a quantidade de AB_2 formada, então, no equilíbrio teremos 1,5 mol.

40. Alternativa **D**.

Com a equação:

$$K_c = \frac{[H_2][I_2]}{[HI]^2}$$

Substituindo pelos valores obtidos:

$$K_c = \frac{1,5 * 10^{-3} \times 2 * 10^{-3}}{(2 * 10^{-2})^2} \Rightarrow K_c = \frac{3 * 10^{-6}}{4 * 10^{-4}} \Rightarrow K_c = 0,75 * 10^{-2} \Rightarrow K_c = 7,5 * 10^{-3}$$

41. INEXISTENTE.

42. Alternativa **D**.

A análise do carácter dos sais faz-se observando as bases e ácidos que o originaram. Nesse sentido:

- **Força dos ácidos:** (i) se hidrácidos: o HI, HCl e HBr são fortes; o HF é moderado, e o restante é fraco. (ii) se oxiácidos: fortes: se a subtracção entre o número de oxigénios e o número de hidrogénios for ≥ 2 . Se 1 é moderado ou 0 é fraco.
- **Força das bases:** (i) todas formadas por elementos das famílias IA e IIA da tabela periódica, excepto o magnésio.

Analisando cada item:

- $KHCO_3$: é formado por KOH (base forte) e H_2CO_3 (ácido moderado), então é **básico**.
- K_2SO_4 : é formado por KOH (base forte) e H_2SO_4 (ácido forte), então é **neutro**.
- NH_4Cl : é formado por NH_4OH (base fraca) e HCl (ácido forte), então é **ácido**.
- KCN : é formado por KOH (base forte) e HCN (ácido fraco), então **básico**.

43. Alternativa **C**.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://www.whatsapp.com/channel/00299879369395)

Se HX é um ácido forte, quer dizer, ioniza-se completamente. $\text{HX} \rightarrow \text{H}^+ + \text{X}^-$.

1.º passo: calcular a molaridade.

Massa molecular de HX = 1 + 37 = 38 g/mol

$$C = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{9,5 \text{ g}}{38 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,5 \text{ L}} = 0,5 \text{ mol/L}$$

2.º passo: determinar o pH.

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] \rightarrow \text{pH} = -\log 5 \times 10^{-1} \rightarrow \text{pH} = -(\log 5 + \log 10^{-1}) \rightarrow \text{pH} = -(0,70 - 1) = \mathbf{0,3}$$

44. Alternativa **D**.

A dissociação de NaOH origina íons hidroxilo. $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

1.º passo: calcular a molaridade.

Massa molecular de NaOH = 23 + 16 + 1 = 40 g/mol

$$C = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{2 \text{ g}}{40 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,5 \text{ L}} = 0,1 \text{ mol/L}$$

2.º passo: determinar o pH.

Sendo assim:

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] \rightarrow \text{pOH} = -\log 10^{-1} \rightarrow \text{pOH} = -(-1) = 1$$

$$\text{Como } \text{pH} + \text{pOH} = 14 \rightarrow \text{pH} = 14 - 1 \rightarrow \text{pH} = 13$$

45. Alternativa **C**.

Ao hidrolisar o composto HCOOH, a acidez da solução será causada pela presença do cátion H_3O^+ :

Então:

	HCOOH	+	H ₂ O	↔	HCOO ⁻	+	H ₃ O ⁺
NO INÍCIO:	0,005 M				0		0
VARIAÇÃO:	-x				+x		+x
NO EQUILIBRIO:	0,005-x				x		x

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/879369395)

A fórmula da constante de acidez é:

$$Ka = \frac{x^2}{0,005 - x} \Rightarrow 2 * 10^{-4} = \frac{x^2}{0,005 - x} \Rightarrow 2 * 10^{-4}(5 * 10^{-3} - x) = x^2$$

$\Rightarrow x^2 + 2 * 10^{-4}x - 10^{-6} = 0$ Resolvendo a equação quadrática, com recurso a fórmula resolvente, obtemos como soluções: $x_1 = -1,1 * 10^{-3}$ e $x_2 = 9,0 * 10^{-4}$. Como a concentração não deve assumir valores negativos, conclui-se que se tem apenas: $9,0 * 10^{-4}$.

Dessa forma:

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] \rightarrow \text{pH} = -\log 9,0 * 10^{-4} \rightarrow \text{pH} = -(\log 9 + \log 10^{-4}) \rightarrow \text{pH} = -(\log 3 + \log 3 + \log 10^{-4}) \rightarrow \text{pH} = -(0,48 + 0,48 - 4) \approx \mathbf{3,0}$$

46. Alternativa **D**.

Nenhuma das alternativas faz referência às concentrações das espécies.

Tendo nos sido fornecidos o valor da constante de ionização e a concentração molar, teremos:

$$Ka = M \times \alpha^2 \Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{Ka}{M}} \Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{4 * 10^{-9}}{2,5 * 10^{-2}}} \Rightarrow \alpha = \sqrt{1,6 * 10^{-7}} \Rightarrow \alpha = \sqrt{16 * 10^{-8}}$$

$$\Rightarrow \alpha = 4 * 10^{-4}$$

Sendo assim:

$$[\text{H}^+] = M \times \alpha \Rightarrow [\text{H}^+] = 0,025 M \times 4 * 10^{-4} \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-5}$$

Daí que:

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log (10^{-5})$$

$$\text{pH} = -(-5)$$

$$\mathbf{\text{pH} = 5,00}$$

47. Alternativa **D**.

Representando a dissociação:

$$K_{ps} = [2\text{A}^+]^2[\text{B}^-]$$

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/879369395)

$$Kps = (2s)^2 \times s \Rightarrow Kps = 4s^2 \times s \Rightarrow Kps = 4s^3 \Rightarrow s = \sqrt[3]{\frac{Kps}{4}}$$

Substituindo pelos dados fornecidos:

$$s = \sqrt[3]{\frac{3,2 * 10^{-47}}{4}} \Rightarrow s = \sqrt[3]{\frac{32 * 10^{-48}}{4}} \Rightarrow s = \sqrt[3]{\frac{32}{4} * 10^{-48}} \Rightarrow s = \sqrt[3]{8 * 10^{-48}}$$

$$\Rightarrow s = \sqrt[3]{2^3 * (10^{-16})^3} \Rightarrow s = \sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{(10^{-16})^3} \Rightarrow s = 2 * 10^{-16} \text{ mol/L}$$

De seguida, vamos determinar a solubilidade em g/L.

1.º passo: calcular a massa molecular do composto.

$$MM(A_2B) = 2 * Ar(A) + Ar(B)$$

$$MM(Pb_3(PO_4)_2) = 2 * 90 + 20$$

$$MM(Pb_3(PO_4)_2) = 200 \text{ g/mol}$$

2.º passo: determinar a solubilidade em g/L.

Da resolução da primeira parte do exercício sabe-se:

$$1 \text{ mol} \text{ ----- } 200 \text{ g}$$

$$2 * 10^{-16} \text{ mol} \text{ ----- } d$$

$$d = 2 * 10^{-16} \times 200 \rightarrow d = 2 * 10^{-16} \times 2 * 10^2 \rightarrow d = 4 * 10^{-14} \text{ g/L}$$

48. Alternativa **C**.

Representando a dissociação do composto:

$$Kps = [2A^+]^2 [3B^-]^3$$

$$Kps = (2s)^2 \times (3s)^3 \Rightarrow Kps = 4s^2 \times 27s^3 \Rightarrow Kps = 108s^5 \Rightarrow Kps = 108(1 * 10^{-2})^5$$

$$\Rightarrow Kps = 108 \times 10^{-10} \Rightarrow Kps = 1,08 \times 10^{-8} M^5$$

49. Alternativa **B**.

Representando a dissociação do composto:

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/879369395)

$$\text{PI} = [\text{Ca}^{2+}][2\text{F}^-]^2$$

Lembre-se da seguinte da relação do produto iônico (PI) e a constante de solubilidade (Kps):

- **PI > Kps:** há formação de precipitado.
- **PI = Kps:** solução saturada (não há formação de precipitado).
- **PI < Kps:** solução insaturada (não há formação de precipitado).

Nesse caso, para que a solução fique saturada $\text{PI} = \text{Kps}$. Sendo assim:

$\text{PI} = \text{Kps} \rightarrow [\text{Ca}^{2+}][2\text{F}^-]^2 = \text{Kps}$. E seja $[\text{Ca}^{2+}] = [\text{F}^-] = s$. Portanto:

$$\text{Kps} = s \times (2s)^2 \Rightarrow \text{Kps} = 4s^3 \Rightarrow s = \sqrt[3]{\frac{\text{Kps}}{4}} \Rightarrow s = \sqrt[3]{\frac{3,2 * 10^{-11}}{4}} \Rightarrow s = \sqrt[3]{8 * 10^{-12}}$$

$$\Rightarrow s = \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{10^{-12}} \Rightarrow s = \sqrt[3]{2^3} \times 10^{-4} \Rightarrow s = [\text{Ca}^{2+}] = [\text{F}^-] = 2 \times 10^{-4} \text{ M}$$

50. Alternativa **C**.

a) Nox de S em SO_2

$$S + 2(-2) = 0$$

$$\mathbf{S = +4}$$

b) Nox de Mn em KMnO_4

$$+1 + \text{Mn} + 4(-2) = 0$$

$$\mathbf{Mn = +7}$$

c) Nox de Br em HBrO

$$+1 + \text{Br} + (-2) = 0$$

$$\mathbf{Br = +1}$$

d) Nox de As em As_4

Nox = 0 (É uma substância elementar).

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/879369395)

e) Nox de O em K_2O_2

$$2(+1) + 2O = 0$$

$$O = -1$$

51. Alternativa **B**.

Para que uma reacção seja termodinamicamente favorável, ou **espontânea**, o valor de ΔG° , que é a **energia livre de Gibbs**, sempre deve ser **menor que zero**.

Uma reacção em que $\Delta G^\circ = 0$ está na situação de **equilíbrio** e quando $\Delta G^\circ > 0$, significa que a reacção **não é espontânea** termodinamicamente.

O **potencial de redução-padrão, E°** , relaciona-se com ΔG° , a **energia livre de Gibbs-padrão**, da seguinte forma: $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$

Por causa do sinal de menos, quando ΔG° for negativo, o que significa o sentido espontâneo, o sinal de E° será positivo. Ou seja, o sentido favorável de uma reacção é sempre aquele com ΔG° **negativo** e o potencial de redução **E° , positivo**.

52. Alternativa **C**.

53. Alternativa **D**.

Os compostos com anel benzénico, podem ser classificados de acordo com a quantidade de anéis: i) mononuclear (quando tem apenas um anel benzeno) e polinuclear (quando tem mais de 2 anéis).

54. Alternativa **D**.

Sabendo que a fórmula geral dos alcenos é C_nH_{2n} , pode-se afirmar o seguinte:

20 moles de C_n geram 60 moles de dióxido de carbono, ou seja, 60 moles de carbono. Portanto:

$$20C_n = 60 \rightarrow C_n = 60/20 = 3$$

Aplicando na fórmula geral dos alcenos, teremos o composto: C_3H_6 – o propeno.

55. Alternativa **E**.

56. Alternativa **D**.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

O composto formado é um **éter**.

57. Alternativa **D**.

Polímero, do grego *polis* = muitos e *meros* = monómero.

Fim!