



Bem-vindo(a) à nossa aplicação de preparação para exames! Chegou a hora de se destacar nos seus testes e conquistar o sucesso acadêmico que você merece. Apresentamos o "Guião de Exames Resolvidos": a sua ferramenta definitiva para uma preparação eficaz e resultados brilhantes!

Aqui, encontrará uma vasta coleção de exames anteriores cuidadosamente selecionados e resolvidos por especialistas em cada área. Nossa aplicação é perfeita para estudantes de todos os níveis acadêmicos, desde o ensino médio até a graduação universitária.

## **EXAME DE ADMISSAO 2018-CIRURGIA- ISCISA**

### **PARTE I (ALTERNATIVA CORRETA)**

1.0 antisséptico cutâneo mais eficaz e:

**Resposta correta:** a) - iodo a 20% em álcool a 70%.

**Explicação:** A concentração de iodo e a percentagem de álcool são fatores críticos na eficácia do antisséptico. Concentrações mais altas de iodo são geralmente mais eficazes, mas concentrações muito altas podem causar irritação da pele. O álcool a 70% é mais eficaz na desinfecção do que o álcool a 90%, pois o álcool a 70% penetra melhor nas células bacterianas.

2. Na hipovolemia ligeira há um déficit de volume sanguíneo de:

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Resposta correta:** é b) - 5 a 10%.

**Explicação:** Hipovolemia ligeira representa uma perda de volume sanguíneo relativamente pequena. As outras opções representam perdas de volume sanguíneo significativamente maiores, caracterizando hipovolemia moderada ou grave.

3.As úlceras cutâneas com bordos arredondados podem corresponder a um(a):

**Resposta:** e) - carcinoma baso celular.

**Explicação:** Úlceras cutâneas com bordos arredondados são uma característica comum do carcinoma baso celular. As outras opções podem apresentar úlceras, mas geralmente com características diferentes.

4.O principal problema imediato da ferida operatória é o(a):

**Resposta:** O problema imediato mais importante numa ferida operatória é a) - hemorragia.

**Explicação:** Hemorragia pode levar a choque hipovolêmico e outras complicações graves. Embora dor, edema, deiscência e infecção sejam preocupações, a hemorragia representa uma ameaça imediata à vida.

5. Segundo a OMS considera-se anemia quando a hemoglobina na mulher é inferior a:

**Resposta:** c) - 12 gr/dl.

**Explicação:** De acordo com a OMS, considera-se anemia em mulheres quando a hemoglobina é inferior a - 12 gr/dl. Este valor é um critério amplamente utilizado para diagnosticar anemia em mulheres adultas.

6.O estabelecimento cirúrgico de uma comunicação entre O rim e a pele chama-se:

**Resposta:** a) - nefrostomia.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Explicação:** O procedimento cirúrgico que cria uma comunicação entre o rim e a pele é nefrostomia. Nefrostomia é um procedimento que cria uma abertura artificial para drenar a urina do rim para o exterior do corpo.

7. Após uma cirurgia limpa e em incisões fechadas sem tensão os pontos devem ser retirados em:

**Resposta:** d) - 5 a 7 dias.

**Explicação:** Em cirurgias limpas com incisões fechadas sem tensão, os pontos devem ser removidos em 5 a 7 dias. Este período permite a cicatrização adequada da ferida, minimizando o risco de deiscência.

8. Numa criança de 04 anos com cartão de peso em dia vítima de uma mordedura de crocodilo deve fazer-se:

**Resposta:** b) - b) -SAT, VAT, analgésicos e antibióticos;

**Explicação:** Em uma criança de 4 anos com cartão de peso em dia, vítima de mordedura de crocodilo, deve-se realizar SAT (suporte avançado de trauma), VAT (suporte avançado de vida), analgésicos e antibióticos. A gravidade do trauma requer uma abordagem multidisciplinar imediata.

9. As feridas incisivas podem ser suturadas desde que tenham menos de:

**Resposta:** a) - 24 horas.

**Explicação:** Feridas incisivas podem ser suturadas se tiverem menos de 24 horas. Após este período, o risco de infecção aumenta significativamente.

10. A toxemia sistêmica associada a dor, edema, eritema e crepitação em redor da ferida operatória e sugestiva de infecção por:

**Resposta:** e) - Estafilococos.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Explicação:** A toxemia sistêmica com dor, edema, eritema e crepitação ao redor da ferida sugere infecção por Estafilococos. Esta manifestação clínica é característica da celulite, frequentemente causada por estafilococos.

11.0 pior soro para combater o choque hemorrágico e o(a):

**Resposta:** b) - dextrose a 5%.

**Explicação:** O pior soro para choque hemorrágico é dextrose a 5%. A dextrose é uma solução hipertônica que pode piorar o choque hipovolêmico, deslocando fluidos para o espaço intravascular.

12. A diurese horária mínima aceitável de um adulto jovem é de:

**Resposta:** b) - 20 a 60 ml.

**Explicação:** A diurese horária mínima aceitável para um adulto jovem é 20 a 60 ml. Uma diurese menor indica possível desidratação ou insuficiência renal.

13.0 agente etiológico da erisipela e o(a):

**Resposta:** a) - Estreptococos.

**Explicação:** O agente etiológico da erisipela é Estreptococos. A erisipela é uma infecção cutânea causada por bactérias estreptocócicas.

14. A via mais importante de infecção durante as intervenções cirúrgicas é o (a):

**Resposta:** e) - mão.

**Explicação:** A via mais importante de infecção durante intervenções cirúrgicas é mão. As mãos dos profissionais de saúde são a principal fonte de contaminação em ambiente cirúrgico.

15. A tesoura usada para a diérese dos tecidos moles e a de:

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário.guardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Resposta:** d) Metzenbaum.

**Explicação:** A tesoura de Metzenbaum é especialmente projetada para cortar tecidos moles delicados. É mais longa e delicada em relação a outras tesouras, como a de Mayo (mais usada para tecidos mais resistentes).

16.0 agente mais responsável pela septicemia e a(o):

**Resposta:** a) *Escherichia coli*

**Explicação:** A *Escherichia coli* é uma bactéria gram-negativa frequentemente responsável por infecções urinárias, que podem evoluir para septicemia, especialmente em pacientes hospitalizados.

17. A causa mais frequente de linfedema crônico em Moçambique é o(a):

**Resposta:** b) *Wuchereria bancrofti*

**Explicação:** A *Wuchereria bancrofti* é um parasita causador da filariose linfática, comum em áreas tropicais e subtropicais, incluindo Moçambique, levando ao linfedema crônico.

18. A transição anatômica entre o esôfago e o estômago chama-se:

**Resposta:** e) cárdias

**Explicação:** A cárdia é a porção anatômica onde o esôfago se conecta com o estômago. O esfíncter esofágico inferior regula essa transição, mas a região anatômica é chamada de cárdia.

19. O canal que comunica a vesícula biliar com a via biliar principal chama-se:

**Resposta:** c) cístico

**Explicação:** O ducto cístico liga a vesícula biliar ao ducto hepático comum, formando o colédoco. É o canal responsável pelo escoamento da bile da vesícula para a via biliar principal.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

20.0 anestésico local mais usado e o(a):

**Resposta:** a) xilocaína com adrenalina.

**Explicação:** A lidocaína (xilocaína) com adrenalina é muito usada porque a adrenalina prolonga a duração do efeito anestésico e reduz o sangramento local por vasoconstricção.

## PARTE II (ALTERNATIVA INCORRETA)

21.Segundo a OMS e analgésico do nível 2 o(a):

**Resposta incorreta:** a) Paracetamol.

**Explicação:** Segundo a OMS, o paracetamol é um analgésico de **nível 1**. Analgésicos de nível 2 incluem tramadol, codeína e morfina fraca.

22.A hemoglobina mínima aceitável para se operar um paciente depende:

**Resposta incorreta:** d) do tipo de cirurgia a realizar.

**Explicação:** Apesar de influenciar a decisão, a hemoglobina mínima aceitável depende mais de **doenças associadas** (respiratória, digestiva, cardiovascular). O tipo de cirurgia é um fator secundário.

23.Uma massa tumoral sangrante do esôfago pode apresentar:

**Resposta incorreta:** e) hemoptises

**Explicação:** Hemoptise é tosse com sangue, geralmente associada ao trato respiratório. Tumores esofágicos podem causar hematemeses (sangue no vômito), odinofagia (dor ao engolir) e disfagia (dificuldade de engolir), mas não hemoptise.

24.São efeitos secundários frequentes da VAT:

**Resposta incorreta:** a) complicações neurológicas.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Explicação:** Complicações neurológicas não são efeitos frequentes da ventilação assistida mecânica (VAT). Os mais comuns são: febre, eritema, reações alérgicas e mal-estar.

25. Influencia a cicatrização adequada das feridas o(a):

**Resposta incorreta:** d) edema acentuado.

**Explicação:** Apesar de o edema influenciar, **não é uma causa principal**. Fatores nutricionais como deficiência de vitamina A, C, anemia e hipoproteïnemia têm papel direto na regeneração tecidual.

26. É causa de abdômen agudo oclusivo ou obstrutivo:

**Resposta incorreta:** a) pancreatite aguda.

**Explicação:** A pancreatite aguda causa abdômen agudo inflamatório, não obstrutivo. Obstruções são causadas por aderências, hérnias, invaginação e vólvulos.

27. O cateter de veia central pode ser colocado na veia:

**Resposta incorreta:** c) braquial

**Explicação:** A veia braquial não é usualmente usada para cateter central. As mais comuns são: subclávia, jugular interna, jugular externa e veia cefálica.

28. É um agente desinfetante químico:

**Resposta Incorreta:** a) álcool etílico.

**Explicação:** O álcool etílico é um **antisséptico**, não um desinfetante de alto nível para materiais. Já o óxido de etileno é realmente um **esterilizante/desinfetante químico** usado para materiais termossensíveis.

29. É causa de febre pós-operatória a:

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Resposta incorreta:** c) atelectasia pulmonar

**Explicação:** Atelectasia pode ocorrer no pós-operatório, mas **não é causa comprovada de febre**. Estudos atuais mostram que sua relação com febre é controversa. As demais (infecção, trombose, pneumonia, flebite) são causas claras.

30. A intoxicação por monóxido de carbono caracteriza-se por:

**Resposta incorreta:** e) alucinações.

**Explicação:** Alucinações não são sintomas típicos de intoxicação por CO. Os sinais mais frequentes são: cefaleia, náusea, tontura, fadiga e **visão turva**, devido à hipoxia tecidual.

31. É causa de hemoptises o (a):

**Resposta incorreta:** a) laceração do pulmão.

**Explicação:** A laceração pulmonar pode **tecnicamente causar hemorragia**, mas **não é uma causa clínica comum de hemoptise** (expectoração com sangue). As causas frequentes incluem bronquiectasia, tuberculose e abscessos.

32. É complicação pós-operatória precoce o(a)

**Resposta incorreta:** e) escara de decúbito.

**Explicação:** Escaras são **complicações tardias**, surgem por permanência prolongada em decúbito, geralmente dias após a cirurgia. Já hemorragia, broncopneumonia, tromboembolismo e atelectasia podem ocorrer nas primeiras 24–48h.

33. A região de maior risco de ocorrência das úlceras de pressão é:

**Resposta incorreta:** e) tornozelo.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Explicação:** O tornozelo não é considerado uma região de alto risco. A região **sacral** é a mais comum, seguida por calcâneo, trocântérica e escápula, principalmente em pacientes acamados.

34. E um dreno tubular o de:

**Resposta incorreta:** d) Penrose.

**Explicação:** O dreno de Penrose é um **dreno laminar**, não tubular. Tubulares são: Foley, Pezzer, Naletton, Malecot. O Penrose apenas permite drenagem passiva de fluidos.

35. A medida mais importante para a profilaxia das infecções pós-operatórias e a:

**Resposta incorreta:** c) antibioterapia prolongada.

**Explicação:** O uso **prolongado** de antibióticos pode causar resistência bacteriana e não é indicado como principal medida preventiva. A **antisepsia adequada** é a medida mais eficaz e recomendada pela OMS.

36. Quanto a profundidade as queimaduras classificam-se em:

**Resposta incorreta:** c) 2º grau superficial

**Explicação:** 2º grau superficial” **não é uma classificação isolada** conforme o padrão tradicional. As classificações geralmente aceitas são: 1º grau, 2º grau (superficial e profundo), 3º grau e 4º grau. A forma como está formulada está **incompleta** e é a menos precisa.

37. E critério menor (de Bangui) da SIDA a:

**Resposta incorreta:** d) dermatite.

**Explicação:** Dermatite **não é critério menor** da definição clínica da SIDA segundo Bangui. Critérios menores incluem: febre prolongada, perda de peso e candidíase oral.

38. E risco das transfusões:

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário.guardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Resposta incorreta:** b) hipertermia.

**Explicação:** Hipertermia **não é risco típico** associado a transfusões. Os principais riscos são: **transmissão de doenças infecciosas**, reações imunológicas, sobrecarga circulatória e coagulopatias.

39.As cobras venenosas possuem venenos:

**Resposta incorreta:** c) citotóxicos.

**Explicação:** Embora existam cobras com ação citotóxica, **nenhuma cobra possui apenas esse tipo de veneno**. A maioria possui **veneno misto**, com componentes neuro, hemo, nefro e citotóxicos combinados.

40.Os intoxicados por organofosforados podem apresentar:

**Resposta incorreta:** e) taquicardia.

**Explicação:** A intoxicação por organofosforados provoca **bradicardia**, miose, sialorreia, fasciculações musculares, devido ao excesso de acetilcolina. **Taquicardia** é oposta ao efeito colinérgico predominante.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

## PUBLICIDADE



FILOSCHOOL

# Acabaram as dúvidas

Resolvemos **qualquer dúvida** de todas as **Disciplinas**

Ensino Secundário

**20MT** por pergunta  
*Pré-pago*

Mensal

**650MT** por Disciplina  
*Pré-pago*


Ensino Superior

**50MT** por pergunta  
*Pré-pago*

**Contactos:**

+258 87 936 9395

[www.filotchila.com](http://www.filotchila.com)



Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/258879369395)