

**INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
(ISCISA)**

Exame Específico de Cirurgia Versão A

Duração: 90 Minutos

Data:

Assinale com uma Circunferência (O) a única alínea verdadeiramente CORRECTA de cada pergunta.

1. O antisséptico cutâneo mais eficaz é o lodo a:

- ☒ a)-20% em álcool a 70%;
- b)-10% em álcool a 90%;
- c)-15% em álcool a 90%;
- d)-20% em álcool a 90%;
- e)-10% em álcool a 70%.

2. As úlceras cutâneas com bordos arredondados podem corresponder a um(a):

- a)-carcinoma escamocelular;
- b)-sarcoma de Kaposi;
- c)-carcinoma epidermóide;
- d)-melanoma maligno;
- ☒ e)-carcinoma basocelular.

3. Segundo a OMS considera-se anemia quando a Hgb na mulher é inferior a:

- a)-08 gr/dl;
- b)-14 gr/dl;
- ☒ c)-12 gr/dl;
- d)-11 gr/dl;
- e)-10 gr/dl.

4. Após uma cirurgia limpa e em incisões fechadas sem tensão, os pontos devem ser retirados em:

- a)-03 a 05 dias;
- ☒ b)-07 a 10 dias;
- c)-10 a 12 dias;
- d)-05 a 07 dias;
- e)-12 a 15 dias.

5. As feridas incisais podem ser suturadas desde que tenham menos de:

- ☒ a)-24 horas;
- b)-08 horas;
- c)-10 horas;
- d)-12 horas;
- e)-06 horas.

6. O pior soro para combater o choque hipovolémico hemorrágico é o(a):

- a)-soro fisiológico;
- ☒ b)-dextrose a 05%;
- c)- lactato de ringer;
- d)-hemacel;
- e)-polielectrolítico de restituição.

7. O agente etiológico da erisipela é o(a):

- ☒ a)-Streptococcus;

8. A tesoura usada para a diérese dos tecidos moles é a de:

- ☒ a)-Mayo;
- b)-Halsted;
- c)-Mixer;
- ☒ d)-Metzembraun;
- e)-Rochester.

9. A causa mais frequente de linfedema crónico em Moçambique é o(a):

- a)-Infiltração neoplásica dos gânglios linfáticos;
- ☒ b)-Wuchereria bancrofti;
- ☒ c)-excisão cirúrgica dos gânglios linfáticos;
- d)-Micobactérium tuberculosis;
- e)-linfogranuloma inguinal.

10. O canal que comunica a vesícula biliar com a via biliar principal chama-se:

- a)-colédoco;
- b)-de Santorini;
- ☒ c)-cístico;
- d)-hepático comum;
- e)-de Wirsung.

11. O cesto destinado a receber as gazes e compressas usadas, restos de fios, etc chama-se cesto de:

- a)-Kocher;
- b)-Havers;
- ☒ c)-Hamper;
- d)-Volkman;
- e)-Harper.

12. A abertura de uma comunicação entre a traqueia e o exterior chama-se:

- ☒ a)-traqueostomia;
- b)-traquelotomia;
- c)-traqueoplastia;
- d)-traqueloplastia;
- e)-traqueotomia.

13. As pinças hemostáticas mais comuns recebem também a designação de pinças de:

- a)-Mixer;
- b)-Halsted;
- ☒ c)-Kelly;
- d)-Crile;
- e)-Rochester.

14. A toma de anticoagulantes (p.e. varfarina e aspirina) deve ser interrompida alguns dias antes das cirurgias electivas, nomeadamente:

- a)-3 dias antes;
- ☒ b)-5 dias antes;
- ☒ c)-7 dias antes;
- d)-10 dias antes;
- e)-12 dias antes.

15. O anestésico geral mais usado nos Hospitais Rurais é o (a):

- ☒ a)-lidocaína;
- ☒ b)-tiopental;
- c)-bupivacaína;
- d)-halotano;
- e)-quetamina.

16. O paciente pode ser operado se a sua glicémia for de:

- a)-2 a 4 mmol/l;
- b)-8 a 12 mmol/l;
- c)-10 a 14 mmol/l;
- ☒ d)-5 a 7 mmol/l;
- ☒ e)-12 a 16 mmol/l.

17. A bactéria que pode invadir pequenas fissuras na pele e propagar-se através do tecido conjuntivo e dos linfáticos é o (a):

- ☒ a)-Staphylococcus aureus;
- b)-Klebsiella;
- ☒ c)-Streptococcus pyogenes;
- d)-Escherichia coli;
- e)-Bacterioides.

18. A Infecção cirúrgica mais comum é o (a):

- a)-celulite;
- ☒ b)-abscesso;
- c)-foliculite;
- d)-erisipela;
- e)-flemão.

19. Os sintomas do tétano mais severo surgem algum tempo depois da contaminação, nomeadamente:

- ☒ a)-15 a 20 dias;
- b)-1 a 3 dias;
- c)-7 a 10 dias;
- d)-10 a 15 dias;
- e)-20 a 25 dias.

20. A monitorização adequada do débito urinário é feita após a cateterização com o catéter de:

- a)-Béquille;
- b)-Levine;
- c)-Felty;
- d)-Pezzer;
- ☒ e)-Foley.

Assinale com uma Circunferência (O) a única alínea claramente **ERRADA** de cada pergunta.

21. A Hgb mínima aceitável para se operar um doente depende:

- a)- de se há doença respiratória associada;
- ☒ b)- de se há doença digestiva associada;
- c)-da idade do paciente;
- d)-do tipo de cirurgia a realizar;
- e)-de se há doença cardiovascular associada.

22. São efeitos secundários frequentes da VAT:

- ☒ a)-as complicações neurológicas;
- b)-a febre e a dor local;
- c)-as reacções alérgicas;
- d)-o eritema e o edema locais;
- e)-o malestar geral e a irritabilidade.

23. É causa de abdómen agudo oclusivo (obstrutivo):

- ☒ a)-a pancreatite aguda;
- b)-as aderências ou bridas;
- c)-as hérnias da parede abdominal;
- d)-o volvo do sigmóide;
- e)-a invaginação intestinal.

24. É um agente desinfectante químico o:

- a)-álcool etílico;
- ☒ b)-óxido de etileno;
- c)-formaldeído;
- d)-fenol;
- e)-hexaclorofeno.

25. A intoxicação por monóxido de carbono caracteriza-se por:

- a)-visão turva;
- b)-fatigabilidade fácil;
- c)-irritabilidade;
- d)-náuseas;
- ☒ e)-alucinações.

26. É complicação pós-operatória precoce o(a):

- a)-hemorragia;
- b)-broncopneumonia;
- c)-tromboembolismo;
- d)-atelectasia pulmonar;
- ☒ e)-escara de decúbito.

27. É um dreno tubular o de:

- a)-Foley;
- b)-Pezzer;
- c)-Naletton;
- ☒ d)-Penrose;
- e)-Malecot.

28. Quanto à profundidade as queimaduras classificam-se em:

- a)-1º grau;
- b)-3º grau;
- c)-2º grau superficial;
- ☒ d)-4º grau;

29. As cobras venenosas podem ter venenos:

- a)-neurotóxicos;
- b)-hematotóxicos;
- c)-citotóxicos;
- d)-hepatotóxicos;
- ☒ e)-mixtos.

30. Os intoxicados por organofosforados podem apresentar:

- a)-sudação;
- b)-bradicardia;
- ☒ c)-miose;
- d)-fasciculação muscular;
- e)-taquicardia.

31. É factor que diminui a síntese de colagénio o (a):

- ☒ a)-hipoproteinémia;
- b)-diabetes mellitus;
- c)-hipovolémia;
- d)-idade avançada;
- e)-obesidade.

32. Podem provocar raiva as mordeduras de:

- a)-humanos;
- ☒ b)-morcegos;
- c)-crocodilos;
- d)-gatos;
- e)-ratos.

33. É vitamina lipossolúvel a vitamina:

- a)-K;
- ☒ b)-A;
- c)-E;
- d)-C;
- e)-D.

34. A ressuscitação bem sucedida caracteriza-se por:

- a)-pele quente e seca;
- b)-diurese de 30-50 ml/hora;
- c)-pele quente e húmida;
- ☒ d)-lucidez;
- e)-pele bem perfundida.

35. É medida importante na profilaxia das infecções pós-operatórias a:

- a)-adequada preparação pré-operatória;
- b)-assépsia e antissépsia;
- ☒ c)-antibioterapia prolongada;
- d)-hemostasia meticulosa;
- e)-antibioterapia profilática.

36. Sugere degenerescência maligna de um nevus o (a):

- a)-alteração brusca do tamanho;
- b)-alteração lenta da cor;
- c)-surgimento de linfadenopatia regional;
- ☒ d)-ocorrência de prurido;
- e)-aparecimento de secreção hemática.

37. É tumoração da pele o:

- ☒ a)-melanoma;
- b)-ganglion;
- c)-linfagioma;
- d)-hemangioma;
- e)-papiloma.

38. É órgão-alvo da hipertensão arterial o (a):

- ☒ a)-cérebro;
- b)-coração;
- c)-fígado;
- d)-olho;
- e)-rim.

39. As cobras venenosas possuem venenos:

- a)-neurotóxicos;
- b)-nefrotóxicos;
- c)-citotóxicos;
- d)-hematotóxicos;
- ☒ e)-mixtos.

40. É sinal de uma anestesia geral superficial:

- a)-movimentos do doente;
- ☒ b)-lacrimação;
- c)-depressão respiratória;
- d)-frequência cardíaca estável ou aumentada;
- e)-aumento da tensão arterial.

BOM TRABALHO