



FILOSCHOOL

Bem-vindo(a) à nossa aplicação de preparação para exames! Chegou a hora de se destacar nos seus testes e conquistar o sucesso académico que você merece.

Apresentamos o "Guião de Exames Resolvidos": a sua ferramenta definitiva para uma preparação eficaz e resultados brilhantes!

Aqui, encontrará uma vasta colecção de exames anteriores cuidadosamente seleccionados e resolvidos por especialistas em cada área. Nossa aplicação é perfeita para estudantes de todos os níveis académicos, desde o ensino médio até a graduação universitária.

GUIA DE RESOLUÇÃO DO EXAME ESPECÍFICO DE CIRURGIA VERSÃO A, ISCISA, 2025

1. O antisséptico cutâneo mais eficaz é o iodo a: **e) 10% em álcool a 70%**.

A iodopovidona a 10% em álcool a 70% é um antisséptico líquido, com um amplo espectro e que apresenta efeito residual de mais de 4 horas.

2. As úlceras cutâneas com bordos arredondados podem corresponder a um(a): **a) carcinoma basocelular**.

O carcinoma basocelular frequentemente apresenta úlceras com bordos arredondados e é o tipo mais comum de cancro de pele, mas o menos agressivo. Bordos bem delimitados é uma característica das tumorações benignas.

3. Segundo a OMS considera-se anemia quando a Hgb na mulher é inferior a: **c) 12 g/dl**.

A mulher, devido ao fluxo menstrual mensal, tem valores de hemoglobina fixados para considerar a anemia inferiores às dos homens, tendo em conta os critérios da OMS.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/879369395)

4. Após uma cirurgia limpa e em incisões fechadas sem tensão, os pontos devem ser retirados em: **c) 7 a 10 dias.**

Esse tempo permite que haja cicatrização adequada e redução de risco de deiscência.

5. As feridas incisivas podem ser suturadas desde que tenham menos de: **e) 06 horas.**

Depois de 6 horas, o risco de contaminação e infecção aumenta exponencialmente.

6. O pior soro para combater o choque hipovolémico hemorrágico é o(a): **b) dextrose a 5%.**

A dextrose a 5% não é eficaz para tratar choque hipovolémico hemorrágico porque não fornece volume intravascular nem reposição de electrólitos necessários.

7. O agente etiológico da erisipela é o(a): **a) *Streptococcus*.**

O principal agente etiológico da erisipela, uma infecção superficial dos tecidos moles, é o streptococcus do grupo A de Lancefield ou *Streptococcus pyogenes*.

8. A tesoura usada para a diérese de tecidos moles é a de: **a) Mayo.**

A tesoura de Mayo curva é comumente usada para a diérese de tecidos moles devido ao seu design robusto e eficácia. Além disso, ela é útil na secção de fios no interior de cavidades.

9. A causa mais frequente de linfedema crónico em Moçambique é o(a): **b) *Wuchereria bancrofti*.**

Wuchereria bancrofti é um parasita que causa filariose, a principal causa de linfedema crónico em regiões tropicais como Moçambique.

10. O canal que comunica a vesícula biliar com a via biliar principal chama-se: **c) cístico.**

O ducto cístico é o canal que conecta a vesícula biliar ao ducto hepático comum, formando a via biliar principal.

11. O cesto destinado a receber as gazes e compressas usadas, restos de fios, etc., chama-se cesto de: **c) Hamper.**

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://wa.me/879369395)

O cesto de Hamper é utilizado para colectar materiais usados durante procedimentos cirúrgicos.

12. A abertura de uma comunicação entre a traqueia e o exterior chama-se: **a) traqueostomia.**

Do grego *ostoma* = cavidade ou comunicação.

13. As pinças hemostáticas mais comuns recebem também a designação de pinças de: **c) Kelly.**

Os instrumentais de hemostasia são identificados pelos nomes de seus idealizadores ou conforme as características apresentadas: Kelly, Halsted, Mixter, Crile e Rochester, podendo ser curvas e rectas, com ou sem dente.

14. A toma de anticoagulantes deve ser interrompida alguns dias antes das cirurgias electivas, nomeadamente: **c) 7 dias.**

Em geral, anticoagulantes como varfarina e aspirina são interrompidos 7 dias antes da cirurgia para reduzir o risco de sangramento.

15. O anestésico geral mais usado nos hospitais rurais é o (a): **e) quetamina.**

A quetamina é um anestésico geral poderoso e com boa margem de segurança, fácil manuseamento, produz um estado de quietude, amnésia e profunda analgesia designado por analgesia dissociativa. Pode ser utilizada tanto intramuscular como endovenosamente. Deve-se pré-mediar com sulfato de atropina pelo risco de hipersalivação.

16. O paciente pode ser operado se a sua glicemia for de: **d) 5 a 7 mmol/l.**

17. A bactéria que pode invadir pequenas fissuras na pele e propagar-se até o tecido conjuntivo e dos músculos é a: **a) *Staphylococcus aureus.***

18. A infecção cirúrgica mais comum é o(a): **b) abscesso.**

19. Os sintomas do tétano mais severo surgem algum tempo depois da contaminação, nomeadamente: **b) 1 a 3 dias.**

O período de incubação do *Clostridium tetani* varia de 1 a 21 dias. Na fase prodrómica da doença tem-se

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

cefaleia, ansiedade e insônia. De seguida, aparecem os espasmos musculares perilesionais, que vão progredindo para outras cadeias musculares, podendo levar a riso sardónico, trismos, disfagia, abolição do reflexo tussígeno e convulsões.

20. A monitorização adequada do débito urinário é feita após a cateterização com o cateter de: **e) Foley.**

DEVE-SE ESCOLHER A ALÍNEA **CLARAMENTE ERRADA** DE CADA PERGUNTA.

21. A Hgb mínima aceitável para se operar um doente depende: **b) de se há doença digestiva associada.**

22. São efeitos secundários frequentes da VAT (vacina antitetânica): **a) as complicações neurológicas.**

23. É causa de abdómen agudo oclusivo (obstrutivo): **a) pancreatite aguda.**

24. É um agente desinfectante químico o: **b) óxido de etileno.**

25. A intoxicação por monóxido de carbono caracteriza-se por: **e) alucinações.**

26. É complicação pós-operatória precoce o(a): **e) escara de decúbito.**

27. É um dreno tubular o de: **d) Penrose.**

28. Quanto à profundidade as queimaduras classificam-se em: **d) 4.º grau.**

29. As cobras venenosas podem ter venenos: **e) hepatotóxicos.**

30. Os intoxicados por organofosforados podem apresentar: **c) miose.**

31. É factor que diminui a síntese de colágeno o (a): **a) hipoproteinemia.**

32. Podem provocar raiva as mordeduras de: **c) crocodilos.**

33. É vitamina lipossolúvel a vitamina: **d) C.**

34. A ressuscitação bem-sucedida caracteriza-se por: **a) pele quente e seca.**

35. É medida importante na profilaxia das infecções pós-operatórias a: **e) antibioterapia profiláctica.**

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

36. Sugere degenerescência maligna de um nevus o (a): **d) ocorrência de prurido.**
37. É tumoração da pele o: **b) ganglion.**
38. É órgão-alvo da hipertensão arterial o (a): **c) fígado.**
39. As cobras venenosas possuem venenos: **b) nefrotóxicos.**
40. É sinal de uma anestesia geral superficial: **c) depressão respiratória.**

FIM!