



INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE  
(ISCISA)

Exame de Admissão de Cirurgia Versão A

Data:

Duração: 90 Minutos

*Leia com atenção o enunciado em seu poder e resolva com clareza, concisão e sem borrões os exercícios que se seguem.*

*Atenção: Escreva primeiro o seu nome no verbete da folha de exame de admissão*

**Assinale com uma circunferência (O) a única alínea CORRECTA de cada pergunta.**

1. Perante uma suspeita de perfuração de úlcera péptica gastro-duodenal o exame que melhor fundamenta o diagnóstico é o (a):

- a)-esofagogastroduodenoscopia;
- b)-Rx esófago-gástrico com contraste de bário;
- c)-Rx simples do abdómen com o doente de pé ou sentado;
- d)-Rx do abdómen em perfil direito;
- e)-ecografia abdominal.

2. A rectorragia da diverticulose do colon caracteriza-se por presença de sangue:

- a)-isoladamente das fezes;
- b)-misturado com as fezes;
- c)-após as defecações;
- d)-misturado com muco;
- e)-na forma de estrias sobre as fezes.

3. Normalmente no adulto-jovem em repouso o ritmo respiratório é de:

- a)-40 incursões/minuto;
- b)-24 incursões/minuto;
- c)-16 incursões/minuto;
- d)-28 incursões/minuto;
- e)-12 incursões/minuto.

4. Habitualmente o adulto-jovem tem em cada 5 minutos os seguintes ruídos intestinais:

- a)-2 a 4;
- b)-3 a 5;
- c)-1 a 5;
- d)-4 a 6;
- e)-7 a 8.

5. As úlceras cutâneas com bordos arredondados costumam corresponder a:

- a)-carcinomas epidermóides;
- b)-carcinomas escamocelulares;
- c)-sífilis;
- d)-carcinomas basocelulares;
- e)-antraz cutâneo.

6. Após uma mordedura o cão não vacinado contra a raiva deve ficar em quarentena:

- a)-15 a 20 dias;
- b)-60 a 75 dias;
- c)-30 a 45 dias;
- d)-5 a 10 dias;
- e)-45 a 60 dias.

7. O tétano mais severo tem um período de incubação de:

- a)-7 a 10 dias;

- b)-1 a 3 dias;
- c)-5 a 7 dias;
- d)-10 a 15 dias;
- e)-15 a 25 dias.

**8.O microorganismo gram-negativo mais frequentemente responsável pelo choque séptico é o (a):**

- a)-Enterobacter;
- b)-Klebsiella;
- c)-Estafilococos aureus;
- d)-Escherichia coli;
- e)-Proteus.

**9.A mortalidade geral por choque séptico é estimada em cerca de:**

- a)-90%;
- b)-25%;
- c)-14%;
- d)-8%;
- e)-70%.

**10.O porta-agulhas mais usado no dia-a-dia das nossas Unidades Sanitárias é o porta-agulhas de:**

- a)-Mayo;
- b)-Mathieu;
- c)-Hegar;
- d)-Mixter;
- e)-Crile.

**11.Quando o conteúdo de uma hérnia é o divertículo de Meckel, a hérnia chama-se de:**

- a)-Richter;
- b)-Maydl;
- c)-Littré;
- d)-Ogilvie;
- e)-Spiegel.

**12.Na falência orgânica múltipla pós-traumática o órgão mais afectado em frequência e intensidade é o:**

- a)-coração;
- b)-cérebro;
- c)-fígado;
- d)-rim;
- e)-pulmão.

**13.Na Escala de Coma de Glasgow (ECG) os valores máximo e mínimo do parâmetro «resposta verbal» são respectivamente:**

- a)-6/15 e 0/15;
- b)-5/15 e 1/15;
- c)-3/15 e 1/15;
- d)-5/15 e 0/15;
- e)-4/15 e 1/15.

**14.O hemotórax massivo caracteriza-se por um volume sanguíneo pleural maior que:**

- a)-1500 ml;
- b)-2000 ml;
- c)-1000 ml;
- d)-2500 ml;
- e)-3000 ml.

**15.Na evolução da resposta metabólica ao trauma considera-se que a fase catabólica dura ou ocorre no período de:**

- a)-1 a 5 dias;
- b)-6 a 10 dias;
- c)-21 a 30 dias;
- d)-16 a 20 dias;
- e)-11 a 15 dias.

**16.A complicação pulmonar pós-operatória que tem início tardio é o (a):**

- a)-atelectasia pulmonar;
- b)-embolia pulmonar;
- c)-colapso pulmonar maciço;
- d)-bronquiectasia;
- e)-abcesso pulmonar.

**17.O osso da mão onde a osteomielite é mais frequente é:**

- a)-o metacarpiano;
- b)-a falange média;
- c)-a falange proximal;
- d)-a falange distal;
- e)-não há diferenças na frequência.

**18.Cerca de 80% das infecções clostrídias são causadas pelo clostrídium:**

- a)-septicum;
- b)-perfrigens;
- c)-tetani;
- d)-novyi;
- e)-botulinum.

**19. O antibiótico e eleição no tratamento da mastite de lactação é o (a):**

- a)-Gentamicina;
- b)-Eritromicina;
- c)-Cotrimoxazol;
- d)-Tetraciclina;
- e)-Metronidazol.

**20. A incidência de infecção da ferida operatória limpa é de cerca de:**

- a)-5%;
- b)-8%;
- c)-2%;
- d)-12%;
- e)-10%.

II

**Assinale com uma circunferência (O) a única alínea ERRADA de cada pergunta:**

**21. São categorias das feridas operatórias as seguintes:**

- a)-ligeiramente contaminadas;
- b)-infectadas;
- c)-limpas;
- d)-maciçamente contaminadas;
- e)-moderadamente contaminadas.

**22. É causa de peritonite secundária a:**

- a)-perfuração de uma víscera oca abdominal;
- b)-rotura de um abcesso intra-abdominal;
- c)-doença inflamatória pélvica;
- d)-ferida penetrante do abdómen;
- e)-necrose transmural de um segmento do tubo digestivo.

**23. É causa de epigastralgia aguda o (a):**

- a)-infarto do miocárdio;
- b)-apendicite aguda;
- c)-úlcera péptica perfurada;
- d)-hemorragia intra-abdominal aguda;
- e)-aneurisma dissecante da aorta.

**24. É tumoração da pele o:**

- a)-ganglion;
- b)-melanoma;
- c)-linfagioma;
- d)-hemangioma;
- e)-papiloma.

**25. Segundo a OMS é um analgésico do nível 2 o (a):**

- a)-Paracetamol;
- b)-Morfina;

- c)-Ibuprofeno;
- d)-Tramadol;
- e)-Codeína.

**26. A hemoglobina mínima aceitável para se operar um doente depende de:**

- a)-se há doença digestiva associada;
- b)-se há doença respiratória associada;
- c)-da idade do doente;
- d)-do tipo de cirurgia a realizar;
- e)-se há doença cardiovascular concomitante.

**27. É um dos critérios de internamento de queimados adultos o seguinte:**

- a)-queimaduras infectadas;
- b)-queimaduras do 2º grau das articulações;
- c)-queimaduras do 3º grau dos genitais externos;
- d)-queimaduras do 2º grau de 5%;
- e)-queimaduras do 3º grau da face.

**28. É causa de apendicite aguda o (a):**

- a)-tumor carcinóide;
- b)-hiperplasia do tecido linfóide;
- c)-fecalito;
- d)-ascaridíase;
- e)-ileite regional.

**29. É um dreno tubular o dreno de:**

- a)-Malecot;
- b)-Pezzer;
- c)-Penrose;
- d)-Nelaton;
- e)-Foley.

**30. São efeitos adversos frequentes da Vacina Anti-Tetânica (VAT) os (as):**

- a)-eritema e dor locais;
- b)-distúrbios neurológicos;
- c)-febre e dor local;
- d)-malestar e irritabilidade;
- e)-reacções de hipersensibilidade.

**31. Na classificação de Bangui é um critério minor da SIDA a:**

- a)-febre há mais de 1 mês;
- b)-tosse há mais de 1 mês;
- c)-candidíase orofaríngea;
- d)-dermatite generalizada;
- e)-linfadenopatia generalizada.

**32. É um agente desinfectante químico o:**

- a)-álcool etílico;
- b)-formaldeído;
- c)-fenol;
- d)-óxido de etileno;
- e)-hexaclorofeno.

**33. É característica dos papilomas benignos:**

- a)-ocorrem em qualquer região da pele;
- b)-geralmente são papilíferos;
- c)-têm uma cor marrom-acinzentado;
- d)-surgem em qualquer idade;
- e)-não têm adenopatias regionais.

**34. É causa de febre pós-operatória a:**

- a)-infecção da ferida operatória;
- b)-pneumonia de estase;
- c)-tromboflebite superficial;
- d)-atelectasia pulmonar;
- e)-trombose venosa profunda.

**35. Sugere degenerescência maligna de um nevus o (a):**

- a)-alteração brusca do tamanho;
- b)-alteração lenta da cor;

- c)-surgimento de linfadenopatia regional;
- d)-ocorrência de prurido;
- e)-surgimento de secreção hemática.

**36. Quanto à sua progressão a dor pode ser:**

- a)-contínua;
- b)-de piora gradual;
- c)-flutuante;
- d)-de declínio gradual;
- e)-de término súbito.

**37. A intoxicação por monóxido de carbono pode caracterizar-se por:**

- a)-visão turva;
- b)-fatigabilidade fácil;
- c)-alucinações;
- d)-irritabilidade;
- e)-náuseas.

**38. É medida importante para a profilaxia das infecções pós-operatórias:**

- a)-antibioterapia prolongada;
- b)-antissépsia;
- c)-boa preparação pré-operatória;
- d)-hemostasia meticolosa;
- e)-técnica cirúrgica apurada.

**39. É causa de tromboflebite superficial:**

- a)-poliartrite;
- b)-arteriosclerose;
- c)-carcinoma gástrico oculto;
- d)-veias varicosas;
- e)-endarterite obliterante.

**40. São riscos das transfusões sanguíneas:**

- a)-transmissão de doenças;
- b)-reacções imunológicas;
- c)-sobrecarga circulatória;
- d)-hipertermia;
- e)-coagulopatia por transfusão massiva.

**BOM TRABALHO!**

A FiloSchool, Lda é a primeira empresa moçambicana que oferece serviços de explicação online e consultoria científica para todos os níveis académicos (ensino secundário e superior) à preços super baratos. 879369395